




Rano otkrivanje karcinoma grlića maternice

Uvod

- ▶ Rak vrata maternice drugo je najčešće sjelo raka u žena u svijetu
 - ▶ U zemljama s organiziranim programima ranog otkrivanja, rak vrata maternice ima najnižu incidenciju i obično je na 10. mjestu po incidenciji oboljenja raka u žena
 - ▶ Simptomi raka maternice nespecifični su i rijetki
- 


Testovi probira

- ▶ Najrašireniji pristup–konvencionalna citologija po Papanicolaou
- ▶ Srednja osjetljivost konvencionalne citologije iznosi 50 do 70%
- ▶ dok je kod tekuće citologije (Liquid Base Citology) 84,4%, a u kombinaciji s HPV–testom 100%

Uzimanje PAPA testa

- ▶ Idealno vrijeme: 10.–16. dana menstruacijskog ciklusa
- ▶ Prije testa žena ne bi trebala imati spolni odnos barem 3 dana i ne koristi vaginalne tablete ili kreme sedam dana prije
- ▶ Bris se uzima drvenom špatulom i četkicom (VCE)
- ▶ Potom se nanese na predmetno stakalce koje se stavlja u 96% alkohol (sredstvo za fiksiranje), potom se boji po metodi Papanikolau

Stare smjernice

- ▶ Sa screeningom početi s 18 godina (tj. od momenta stupanja u seksualne odnose)
 - ▶ Kontrolni PAPA 1x godišnje
 - ▶ Ukoliko 2 uzastopna nalaza uredna – kontrola na 2 godine
 - ▶ Svaka pac. sa CIN–om bez obzira na dob i svaka >30 godina: HPV DNA screening test
- 

Što je “novo”?

- ▶ Po posljednjim preporukama Američkog udruženja opstetričara i ginekologa (ACOG)
- ▶ sa screeningom početi u dobi od 21 godinu
- ▶ žene u dobi od 21–29 g. trebale bi raditi kontrolni PAPA test svako 3 godine
- ▶ žene 30–65 god.: PAPA+test na HPV svakih 5 god., dok je samo PAPA svake 3 god.
"prihvatljiv"

Što je “novo”?

- ▶ Optimalni početak: 3 god. nakon početka seksualnih odnosa ili sa 21 god.
- ▶ Ne postoji jasno određena krajnja dobna granica za prestanak redovnog PAPA testiranja
- ▶ ALI: ne postoje ni dokazi o korisnosti PAPA testa nakon 64 god (ako su imale tri negativna PAPA testa, ako nemaju povijest ozbiljne displazije ili raka).

Zašto HPV iznad 30 god?

- ▶ HPV infekcija je vrlo česta u mladih žena, ali obično nestane sama od sebe
- ▶ Pozitivan HPV test u mladih žena će najvjerojatnije postati negativan bez ikakvog tretmana

Smjernice EU

- ▶ Prema smjernicama Vijeća Europske unije probir na **nacionalnoj razini** bi trebalo započeti kod žena u dobi od 20–30 godina
- ▶ Probir bi valjalo nastaviti u 3 do 5–godišnjim intervalima do dobi od 60 ili 65 godina starosti
- ▶ Gornja granica ne bi trebala biti niža od 60 godina starosti

Oportunistički probir

- ▶ Oportunistički probir koji se provodi u kliničkim uvjetima i koji ovisi o inicijativi pojedine žene i njenog liječnika, treba obeshrabrivati. Ovakve aktivnosti često su karakterizirane visokim obuhvatom u dijelovima populacije koje se prečesto podvrgavaju probiru, s istovremenim niskim obuhvatom drugih skupina populacije slabijeg socioekonomskog statusa i heterogene kvalitete što rezultira ograničenom učinkovitošću i slabom ekonomskom isplativošću.



HVALA NA POZORNOSTI